

T2 – Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

označení plochy nebo objektu	název	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
1a	prameniště s těžišťem bledule	0,02	<p>Podlouhlý podmačený úsek lučního prameniště v terénní depresi (údolnici) ve střední části lokality, blízkí se sv. Caricion rostratae. Místy významně dominuje sítina rozkladitá (<i>Juncus effusus</i>), dále se vyskytuje ostřice obecná (<i>Carex nigra</i>), místy ostřice Hartmanova (<i>Carex hartmanii</i>).</p> <p>Je zde těžiště výskytu bledule jarní s odhadovaným počtem cca 400 jedinců, rozložení je poměrně husté a rovnoměrné.</p> <p>Dlouhodobým cílem je udržení vodních poměrů v místě a zachování populace bledule jarní šetrným extenzivním kosením.</p>	2x kosení ruční (křovinořez), event. ručně vedenou sekačkou, okamžitý odklíz hmoty	1	červen, září	1 rok
1b	střídavě vlhká louka	0,22	<p>Největší část PP zaujímá střídavě vlhká louka sv. Molinion s různými fázemi degradace – zejm. lokální výskyt třtiny křovištní či zvyšování pokryvnosti psárky luční. Zcela ochuzené, ruderalizované okraje vymezeny samostatně jako plocha 1c. Z trav dominuje bezkolenec modrý (<i>Molinia caerulea</i>), z dalších druhů se objevuje sítina rozkladitá (<i>Juncus effusus</i>), pcháč bahenní apod.</p> <p>V porostu se nacházejí dílčí plošky s cca nižšími desítkami jedinců bledule jarní ve shlucích.</p> <p>Dlouhodobým cílem je zachování existující druhové bohatosti, v rámci možností potlačení expanze graminoidů a eventuální rozšiřování shluků bledulí.</p>	<p>2x kosení ručně vedenou sekačkou či lehkou technikou, okamžitý odklíz hmoty</p> <p>v první seči ponechat 10-20% plochy neposečené (kruhy o průměru cca 10m), sklídit ve druhé seči; neposečená místa neponechávat na plochách s náznaky degradace</p>	1	červen, září	1rok
1c	degradované okraje louky	0,03	<p>Jedná se o okraje louky 1b degradované v souvislosti okrajového efektu (blízkost zemědělských pozemků, komunikace). Degradace se projevuje ochuzením bylinné skladby a expanzí nežádoucích druhů jako kopřiva dvoudomá.</p> <p>Dlouhodobým cílem je prevence další expanze nežádoucích druhů a zabránění jejich šíření do jádrových ploch.</p>	min. 2x ročně kosení libovolnou technikou, okamžité odklizení hmoty, celoplošné kosení bez ponechání nesečených míst	1	květen-červen, srpen-září	1 rok

2a	solitéry / skupinky dřevin	0,01	Jde o solitérní dřeviny na okraji PP (vrba křehká, bříza bělokorá), bez zvláštního ochrannářského významu. Dlouhodobým cílem je běžná údržba dřevin a omezování jejich šíření.	odklizení spadaných větví, event. občasné prořezání	3	v zimním období cca listopad – březen	3-5 let
2b	souvislejší porost dřevin	0,05	Souvislejší porost dřevin lemující menší rybníček (plocha 3), není ochrannářsky významný. Z dřevin zastoupen dub letní, bříza bělokorá, bez černý, vrba jíva a vrba křehká. Dlouhodobým cílem je zachování charakteru porostu s možností jeho prosvětlení.	odklizení spadaných větví, občasné vyřezání náletu, výjimečně pokácení jednotlivých vzrostlých stromů; občasné vysekání podrostu a odklizení hmoty	3	v zimním období cca listopad – březen	3-5 let
3	malý rybníček	0,01	Malý, hlubší rybníček (tůňka) eutrofního charakteru, bez ochrannářského významu. Dlouhodobým cílem je zachování rybníčku s možností ponechání zazemnění a postupného vytvoření mokřadu.	obsekání okrajů křovinořezem, odkliz hmoty	3	červen- září	3 roky
X	zemědělský pozemek TTP - k vypuštění	0,72	běžně zemědělsky obhospodařovaný pozemek (strojní kosení), druhově relativně chudý, bez zvláště chráněných ani citlivějších druhů	vypuštění ze ZCHÚ	1	---	---